

Внимание!
Инструкция в Вашей стране может отличаться.
Смотрите инструкцию, зарегистрированную в Вашей стране.

Инструкция по применению: информация для пользователя

RECREOL 50 мг/г мазь *Dexpanthenolum*

Перед применением этого лекарства внимательно прочитайте всю инструкцию, так как она содержит важную для Вас информацию.

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в этой инструкции, или же так, как указал Вам врач или фармацевт.

- Сохраните эту инструкцию! Возможно, что позже потребуется ее перечитать.
- Если Вам необходима дополнительная информация или совет, спрашивайте фармацевта.
- Если у Вас возникли какие-либо побочные действия, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Это относится также к возможным побочным действиям, не упомянутым в этой инструкции. Смотрите пункт 4.
- Если Вы не чувствуете себя лучше или чувствуете себя хуже спустя 14 дней после начала лечения, Вам следует проконсультироваться с врачом.

В этой инструкции можете узнать:

1. Что такое RECREOL и для чего его применяют
2. Что Вам следует знать перед применением RECREOL
3. Как применять RECREOL
4. Возможные побочные действия
5. Как хранить RECREOL
6. Содержимое упаковки и другая информация

1. Что такое RECREOL и для чего его применяют

Мазь RECREOL содержит активное вещество декспантенол, который принадлежит к группе лекарственных средств для лечения ран и язв. В тканях декспантенол превращается в пантотеновую кислоту. Пантотеновая кислота восстанавливает эластичность кожи и стимулирует заживление ран.

Мазь RECREOL применяют:

- для лечения поверхностных повреждений кожи (небольших ожогов и трещин кожи, ссадин и растрескиваний кожи), воспаления кожи (возникающего при воздействии лучевой терапии, фототерапии или ультрафиолетового излучения).

2. Что Вам следует знать перед применением лекарства RECREOL

Не применяйте мазь RECREOL в следующих случаях:

- если у Вас аллергия к декспантенолу или какому-либо другому (упомянутому в пункте 6.) компоненту этого лекарства;
- не применяйте мазь на раны, если у Вас гемофилия, потому что имеется высокий риск кровотечения.

Предупреждения и меры предосторожности при применении

Применения мази RECREOL следует прекратить в случае возникновения признаков аллергической реакции.

Следует избегать случайного попадания мази в глаза.

Если Вы не чувствуете себя лучше или чувствуете себя хуже спустя 14 дней после начала применения, Вам следует проконсультироваться с врачом.

Другие лекарства и RECREOL

Расскажите врачу или фармацевту обо всех лекарствах, которые применяете в последнее время, применяли или могли бы применять.

Нет доказательств того, что мазь RECREOL взаимодействует с другими лекарствами.

Беременность, кормление грудью и фертильность

Мазь RECREOL можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания.

Исследования влияния декспантенола на фертильность человека не проводились.

Управление транспортными средствами и обслуживание механизмов

Мазь RECREOL не влияет на способность управлять транспортными средствами и обслуживать механизмы.

Мазь RECREOL содержит цетиловый спирт, стеариловый спирт и ланолин

Цетиловый спирт, стеариловый спирт и ланолин могут вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

3. Как применять RECREOL

Всегда применяйте это лекарство точно так, как описано в этой инструкции или как Вам указал врач или фармацевт. В случае неясности спрашивайте врача или фармацевта.

Для наружного применения.

Если не указано иначе, декспантенол наносят тонким слоем на поврежденный участок кожи один или несколько раз в день. Продолжительность курса лечения зависит от характера и тяжести заболевания.

Пациенты с нарушениями деятельности почек и печени

Исследования пациентам с нарушениями деятельности почек и печени не проводились.

Пациенты пожилого возраста

Исследования пожилым пациентам (в возрасте от 65 лет и старше) не проводились.

Применение детям

Декспантенол можно применять детям.

Если Вам кажется, что действие мази RECREOL слишком сильное или слишком слабое, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4. Возможные побочные действия

Подобно всем лекарствам, это лекарство может вызывать побочные действия, хотя не у всех они проявляются.

Очень редко (могут появиться меньше чем у 1 из 10 000 человек): аллергические реакции и аллергические кожные реакции, контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, покраснение кожи, экзема, высыпания, крапивница, раздражение, язвы кожи.

Информирование о побочных действиях

Если у Вас появляются какие-либо побочные действия, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Это относится также к возможным побочным действиям, которые не упомянуты в этой инструкции. Вы можете сообщать о побочных действиях также непосредственно в Государственное агентство лекарств, Улица Йерсикас 15, Рига, LV-1003. Телефон: +371 67078400; Факс: +371 67078428. Веб-страница: www.zva.gov.lv.

Сообщая о побочных действиях, Вы можете помочь в обеспечении наиболее широкой информации о безопасности этого лекарства.

5. Как хранить RECREOL

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в невидимом и недоступном для детей месте.

Не применять это лекарство по истечении срока годности, указанного на пачке после «Годен до». Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

Не выбрасывайте лекарство в канализацию или в бытовые отходы. Спрашивайте фармацевта, как уничтожаются лекарства, которые больше не применяете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и другая информация

Что содержит мазь RECREOL

- Активное вещество декспантенол. 1 г мази содержит 50 мг декспантенола.
- Другие компоненты: стеариловый спирт; цетиловый спирт; воск пчелиный белый; протегин XN (парафин жидкий, петролатум, озокерит, глицерил олеат,

ланолиновый спирт), масло миндальное очищенное, парафин белый, парафин жидкий, ланолин, вода очищенная.

Внешний вид и упаковка мази РЕКРЕОЛ

Гомогенная мазь желтоватого цвета со специфическим запахом.

По 30 г или 50 г в тубе алюминиевой. Туба закрыта алюминиевой мембраной и снабжена белой навинчивающейся крышечкой. Туба алюминиевая в пачке картонной.

Не все виды упаковки могут быть доступны в продаже.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель

АО ГРИНДЕКС.

Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия

Тел.: +371 67083205

Факс: +371 67083505

Эл. почта: grindeks@grindeks.lv

Данная инструкция по применению в последний раз пересмотрена 02/2017